

HATALMAS BOTRÁNY! Rákellenes vitamint titkol a gyógyszeripar!

2014 július 12. Flag

Szöveg méret

90
Mentés

- 0

1

Átlag: 1 (1 szavazat)

Mérték

World Without Cancer cím? kötetében az amerikai Edward Griffin leleplezi a titkot a B17 vitaminról, amelyet a gyógyszeripar régóta próbál eltitkolni és amely ráköl? hatásáról már éve óta tudni lehet.

Már bizonyított tény, hogy a B17 vitamin, más nevén laetril hamar megöli a rákos sejteket. A szerz? több információt is leleplez a rákgyógyításról köszönhet?en a B17 vitaminnak, és felteszi a kérdést **“Miért nem használja a hagyományos orvoslás ezt a vitamint?”**



Griffin szerint a B17 vitamint azért nem használják a hagyományos orvoslásban, mert a gyógyszeriparnak nem érdeke meggyógyítani az embereket. Évente több milliárd dollárt költenek kutatásokra és a rák kezelésére, ugyanakkor több milliárd dollárt azokra a gyógyszerekre, amelyek felveszik a rákkal szembeni versenyt. Ezek fényében **a B17 vitamin eltusolása gazdasági lépés a gyógyszergyártók által uralt világunkban.**

A B17 vitamin leginkább a kajszi magjában található. Jótékony hatását már ezel?tt 35 évvel bizonyították. A Második Világháborúban, Dr. Max Gersonsikeresen alkalmazta ezt a vitamin páciensein.

A B17 vitamin a kajszi, a mandula, a meggy, körte, szilva és az alma magjában található, de van bel?le a lenmagban és sz?l?magban is.

Jelenlegi életvitelünk során rengeteg fehérlisztet, cukrot, olajat és félkész ipari terméket fogyasztunk, míg az organikus, természetes élelmiszerek egyre ritkábbak az étrendünkben. Nagyszüleink még fogyasztottak ezekb?l az ételekb?l, ez is azt bizonyítja, hogy **az ? idejükben ritka volt a rákbetegség**, anélkül jutottak hozzá a vitaminokhoz, hogy tudatosan tudták volna, épp a betegségekt?l mentik meg magukat.

A **B17 vitamint ezel?tt 35 éve betiltották a rákbetegség kezelése esetén**, annak ellenére, hogy sokan úgy tartják ha minden nap fogyasztunk ezekb?l a vitaminokból, elkerülhetjük a rákbetegségek kialakulását.

A szerz? szerint **az amerikai gyógyszergyártól hatalmas nyomást gyakoroltak a hatóságokra**, így azok illegálisnak titulálták azokat a készítményeket, amelyek a B17 vitamint tartalmazták. S?t, sok esetben azt a pletykát terjesztették, hogy a kajszimag ciánt tartalmaz, így megmérgezheti azt, aki fogyasztja. Az igazság az, hogy eddig senki sem halt meg a kajszimagtól, még akkor sem ha nagy adagban fogyasztott kajszimagot vagy mandulát, **írja Edward Griffin könyvében.**

írta: Nagy L. József - [Webhir.com] - A cikk eredetije itt olvasható!

Az alábbiakban a sárgabarackmag emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásairól ejtünk szót. Többek között a legfontosabb, amit a sárgabarack-magból tartalmaz, az a nitrilozid, azaz a B-17 vitamin. Az alábbiakban olvashat a B-17 vitamin hatásmechanizmusáról, melyet az emberi szervezetben kifejt.

A B-17 vitamin molekulának, a barackmag-bélben két természetes megjelenési formája van. Az egyik $C_{20}H_{27}NO_{11}$ a másik $C_{14}H_{15}NO_7$.

A hazai sárgabarack magból kapható a gyógynövény szaküzletekben, keser? és édes változatban. A keser? sárgabarack magból B-17 vitamin tartalma háromszor magasabb, mint az édes magé.

Mi nem arra hivatkozunk, hogy a Hunza királyságban ismeretlen a rákbetegség, mely természetesen igaz. Az is igaz, hogy az észak amerikai indiánok étrendje is sok B-17 vitamint tartalmaz és szinte ismeretlen közöttük a rákbetegség. Mi azt kívánjuk rövid tájékoztatónkban közkincsé tenni, hogy miért van így és mit is tud a B-17 vitamin.

Egy szem sárgabarack magbél az édes fajtából 1-5 mg, a keser? magbél 15 - 25 mg nitrilozidot azaz B-17 vitamint tartalmaz. Mivel vízben oldódó vitaminról van szó, az emberi szervezet számára szükséges mennyiség ebb?l a vitaminból napi 250 - 300 mg. Amennyiben nem jut a szervezetbe megfelel? mennyiség? B-17 vitamin, úgy hiánya rákbetegséget okozhat. Egy közismert példa a vízben oldódó vitamin hiányára: Egy másik igen fontos vízben oldódó vitamin a C-vitamin, melynek hiánya skorbutot, az immunrendszer gyenge m?ködését eredményezi.

Mint ahogy a C-vitamin a skorbut megel?zésére, úgy a B-17 vitamint a rák megel?zésére alkalmazhatjuk.

Az alábbiakban rövid kivonatot közlünk ifj. Ernest T. Krebs tanulmányaiból:

"A rákos megbetegedések megel?zéséhez, kiküszöböléséhez szinte nélkülözhetetlen a B-17 vitamin. Ezen vitaminban gazdag étrendhez tartósan igazodó emberek közül senki nem lesz rákos beteg. Mi történik ha valaki magas nitrilozid tartalmú magot, sárgabarackmagot fogyaszt. Hogyan is pusztulnak el a rákos sejtek a nitrilozid azaz a vízben oldódó B-17 vitamintól ?

Hatásmechanizmus

A B-17 vitamin molekulában két rész cukor, egy rész benzaldehid és egy rész cián van, melyek szorosan összekapcsolódnak. Mindenki tudja, hogy a cián er?sen mérgez? lehet és kell?en nagy mennyiségben halálos. Azonban ebben a természetes állapotában vegyileg nem reagál és semmiféle hatással nincs az él? szövetekre. Hasonlatképpen érdemes megemlíteni, hogy a klórgáz szintén halálos, de amikor nátriummal létesít kötést, nátrium-kloridot képezve, egy viszonylag ártalmatlan vegyület jön létre, melyet konyhasóként ismerünk.

Az él? szervezetben csak egyetlen vegyület képes felszabadítani a ciánt a B17 molekulából, ez pedig a bétaglükozidáz néven ismert enzim. Amikor a B-17 vitamin víz jelenlétében érintkezésbe lép ezzel az enzimmel, nem csak a cián, hanem a benzaldehid is felszabadul mely önmagában is igen mérgez?. Ami azt illeti ez a két vegyület együttesen százszor olyan mérgez?, mint külön-külön.

Szerencsére a kibontó enzim azaz a bétaglükozidáz sehol nincs jelen veszélyes mennyiségben a testünkben, csak a rákos szövetekben, ahol mindig nagy mennyiségben található meg: szintje a környez? normális sejtekben mérhet?höz képest több mint százszorosát is elérheti. Ennek eredményeképpen a B-17 vitamin a rákos sejtek területén bomlik fel, mérgez? tartalmát a rákos sejtek területén engedi szabadon, és sehol máshol! Létezik egy másik fontos enzim is, a rodanéz, melyet "védelmi enzimként" említünk. Azért nevezzük így, mert képes semlegesíteni a ciánt, azonnal melléktermékké tiocianát molekulává alakítva azt. Ez az enzim mindenütt nagy mennyiségben jelen van, kivéve a rákos sejtek területét, melyeket következés képen nem is védi meg.

További jótékony hatások

A melléktermékek egyenesen jótékony hatással vannak a szervezetre és létfontosságúak az egészség szempontjából. Az emberi szervezetben felszabaduló benzaldehid oxigén jelenlétében benzoesavvá oxidálódik, mely kifejezetten antireumatikus fert?tlenít? tulajdonságú vegyület."

Mint ahogy azt fent említettük, szervezetünk számára az egészség meg?rzéséhez a napi B-17 vitamin szükséglet 250 - 300 mg. Ez a mennyisége kb. 35-40 szem édes, vagy 12 - 15 szem keser? sárgabarackmag elfogyasztásával fedezhet?.

http://szivarvany-auracentrum.hu

Tisztelt olvasók! Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a **Flag Polgári Magazin** facebook oldalát, a következ? címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu



Ajánló